ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ A DƠI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1838/UBND-KT	*A Dơi, ngày 22 tháng 11 năm 2026*
V/v hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong phòng trừ cỏ dại trên cây trồng vụ Đông Xuân 2026-2027	

Kính gửi:

- Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã;
- Ban Quản lý các thôn trên địa bàn xã.

Thực hiện Hướng dẫn số 1369/HD-TTBVTV ngày 19/11/2026 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Trị về việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trong phòng trừ cỏ dại trên cây trồng vụ Đông Xuân 2026-2027 và Công văn số 10868/SNNMT-TTBVTV ngày 17/11/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, quản lý việc sử dụng thuốc trừ cỏ không chọn lọc trên địa bàn;

Vụ Đông Xuân 2026-2027, thời tiết trên địa bàn dự báo diễn biến phức tạp, nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước,... là điều kiện thuận lợi để các loại cỏ dại sinh trưởng mạnh, phát sinh, lây lan diện rộng. Trong điều kiện thời tiết bất thuận, việc sử dụng thuốc BVTV, đặc biệt là thuốc trừ cỏ không đúng kỹ thuật có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây trồng, đồng thời làm giảm hiệu quả phòng trừ cỏ dại.

Để chủ động phòng trừ cỏ dại hiệu quả ngay từ đầu vụ, bảo đảm an toàn cho cây trồng và môi trường trong sản xuất vụ Đông Xuân 2026-2027, Ủy ban nhân dân xã A Dơi đề nghị Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã và Ban Quản lý các thôn thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến Nhân dân trên địa bàn biết và thực hiện tốt các giải pháp kỹ thuật phòng trừ cỏ dại trên một số loại cây trồng chính như sau:

1. Trên cây lúa

1.1. Thuốc tiền nảy mầm

- Một số hoạt chất: Pretilachlor + chất an toàn, Butachlor + chất an toàn, Acetochlor, Oxadiazon,…

- Kỹ thuật sử dụng: Phun thuốc sau khi gieo 1 - 3 ngày, khi ruộng có đủ độ ẩm theo yêu cầu của từng loại thuốc. Sau khi phun 2 - 3 ngày, điều tiết nước vào ruộng ở mức phù hợp, bảo đảm mặt ruộng đủ ẩm hoặc xăm xắp nước theo hướng dẫn của nhãn thuốc; tránh để ruộng khô hạn làm giảm hiệu lực của thuốc.

1.2. Thuốc hậu nảy mầm sớm

- Một số hoạt chất: Butachlor, Pyrazosulfuron Ethyl, Acetochlor,…

- Kỹ thuật sử dụng: Phun thuốc sau khi gieo, cấy 5 - 7 ngày hoặc khi cỏ có lá thật. Đối với lúa cấy, giữ mực nước trong ruộng 2 - 3 cm trong vòng 5 - 7 ngày sau phun. Đối với lúa gieo, giữ đất đủ ẩm và đưa nước vào ruộng sau phun thuốc 3 - 5 ngày. Không để nước ngập ngọn lúa hoặc ruộng khô sẽ ảnh hưởng đến hiệu lực của thuốc.

1.3. Thuốc hậu nảy mầm muộn

- Một số hoạt chất: Quinclorac, Bentazone, Bensulfuron Methyl, Cyhalofop butyl, Metazosulfuron, …

- Kỹ thuật sử dụng: Phun thuốc sau khi cấy 7 - 14 ngày, khi lúa gieo có 2 - 3 lá, giữ mực nước trong ruộng 2 - 3 cm trong vòng 5 - 7 ngày sau phun thuốc.

2. Trên ruộng màu (đậu, vừng, ngô…)

- Một số hoạt chất: Acetochlor, Atrazine, S-Metolachlor, Topramezone, Fluroxypyr-meptyl, Flumioxazin,…

- Kỹ thuật sử dụng: Tiến hành phun thuốc 1 - 3 ngày sau khi gieo hạt, giữ đất đủ ẩm sau khi phun thuốc.

3. Trên cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả

- Một số hoạt chất có thể được sử dụng tùy theo phạm vi đăng ký của từng sản phẩm: Diquat, Glufosinate ammonium,...

- Kỹ thuật sử dụng: Thực hiện phun thuốc có kiểm soát tại khu vực có cỏ dại; tránh để thuốc tiếp xúc trực tiếp với lá, chồi non, thân non và các bộ phận xanh của cây trồng. Không phun khi có gió lớn hoặc điều kiện thời tiết có nguy cơ làm thuốc bay dạt sang cây trồng khác.

- Liều lượng, nồng độ và phương pháp sử dụng phải tuân thủ đúng hướng dẫn trên nhãn thuốc.

4. Những lưu ý quan trọng khi sử dụng thuốc trừ cỏ

- Chỉ sử dụng thuốc BVTV có trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam; tuyệt đối không sử dụng thuốc ngoài danh mục, thuốc cấm hoặc thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

- Thực hiện nghiêm nguyên tắc "4 đúng": đúng thuốc, đúng lúc, đúng nồng độ/liều lượng và đúng cách; đọc kỹ hướng dẫn trên nhãn thuốc trước khi sử dụng, bảo đảm lượng nước pha thuốc theo quy định.

- Không phun thuốc khi cây trồng đang bị ảnh hưởng bởi rét đậm, rét hại làm giảm hiệu quả hoặc tăng nguy cơ gây hại cho cây trồng.

- Thực hiện thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng đúng nơi quy định, không vứt bừa bãi xuống kênh mương, ao hồ và khu vực sản xuất gây ô nhiễm môi trường.

- Lưu ý riêng đối với thuốc trừ cỏ trên lúa: Khi sử dụng thuốc có hoạt chất diệt cỏ Pretilachlor, Butachlor ở giai đoạn tiền nảy mầm, phải chọn loại sản phẩm thuốc có chất an toàn để sử dụng trong vụ Đông Xuân. Do hoạt chất Pretilachlor, Butachlor có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây trồng, đặc biệt khi sử dụng gặp thời tiết rét đậm, rét hại hay phun chồng lối sẽ gây nên hiện tượng cây lúa bị vàng, xoăn lá và có thể bị chết nếu hàm lượng chất an toàn trong dung dịch nước thuốc thấp hoặc không có.

- Khi phun thuốc trừ cỏ không được trộn chung thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm và hậu nảy mầm, không trộn với các loại thuốc bảo vệ thực vật khác kể cả phân bón lá, không phun thuốc khi nhiệt độ xuống thấp hơn 18°C.

- Trường hợp sau khi phun thuốc nếu lúa bị ngộ độc do thuốc trừ cỏ thì cần đưa nước vào ruộng, không bón thêm phân đạm, tăng cường bón phân lân, kali (2 - 3 kg/500 m²) hoặc phun các loại phân bón lá giàu kali để giải độc cho lúa.

Ủy ban nhân dân xã A Dơi đề nghị Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã tăng cường thời lượng phát sóng, biên tập tin bài tuyên truyền thường xuyên trên hệ thống Đài truyền thanh xã để Nhân dân nắm bắt và áp dụng; Ban Quản lý các thôn chủ động thông tin, phổ biến trực tiếp đến các hộ sản xuất trên địa bàn biết, thực hiện; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc (nếu có) về Ủy ban nhân dân xã (qua Phòng Kinh tế) để phối hợp xử lý./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Trang Thông tin điện tử xã;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Văn Ngoai